

Fruchtschädigende Wanzen

Marmorierte Baumwanze

Bei unserem Monitoring finden wir nach wie vor die meisten Nymphen und Adulten der Marmorierten Baumwanzen auf anderen Wirtspflanzen wie z. B. Hecken oder anderen Obstarten. Dort hat die Präsenz in den letzten Tagen zugenommen.

Kontrollen durchführen und bei Bedarf behandeln

Kontrollieren Sie weiterhin Ihre Anlagen auf Wanzen und Einstichstellen. Die Kontrollen sollten idealerweise am Morgen durchgeführt werden. Bei Präsenz des Schädlings empfehlen wir eine Behandlung.



Heimische Wanzen

Besonders in den höheren Anbaulagen treten derzeit alle Entwicklungsstadien verschiedener heimischer fruchtschädigender Wanzenarten auf. Es sollten weiterhin Kontrollen durchgeführt werden. Bei Präsenz empfehlen wir eine Behandlung durchzuführen.

Mittelwahl

Zur Mittelwahl siehe Rundschreiben Nr. 23.

Weißer Hauch

Bei unseren Kontrollen sind uns bisher nur ganz vereinzelt Früchte mit Weißem Hauch aufgefallen.

In der Regel werden zuerst Früchte im unteren Baumbereich befallen. Ein wichtiges Merkmal des Weißes Hauchs ist der typische Pilzgeruch der befallenen Früchte.

Abwehr

Behandlungen mit **Captanmitteln** und **Kaliumphosphonat** gegen den Rußtau haben laut Versuchen des Versuchszentrums Laimburg auch eine Nebenwirkung gegen den Weißen Hauch.