

Sesia del melo

In occasione del nostro monitoraggio abbiamo osservato, nelle ultime settimane, un costante aumento del volo della sesia sia nel fondovalle che in media e alta collina.

Il volo continua da ca. metà maggio a fine agosto. Riteniamo che il picco di volo lentamente sia stato raggiunto e che da metà luglio cominci a calare.

Difesa diretta

Nei frutteti colpiti si può trattare **fin da subito** il portinnesto fino al punto di innesto con un prodotto a base di **etofenprox** in miscela con 1 l/hl di **olio paraffinico**.

Ragnetti ed eriofidi: osservati singoli attacchi

Ultimamente, in alcuni frutteti abbiamo verificato la presenza di un attacco da parte di ragnetti (soprattutto rosso, ma in qualche caso anche ragnetto rosso dei fruttiferi). Per contro, l'attacco di eriofidi è raro. Nelle ultime settimane, in molti impianti la popolazione di acaro-predatori è aumentata. Consigliamo di effettuare controlli soprattutto in frutteti con problemi di attacchi di ragnetti o di eriofidi rilevati lo scorso anno.

In caso di bisogno si possono impiegare le seguenti sostanze attive:

- Abamectina
- Acequinocyl
- Pyridaben
- Exitiazox
- Tebufenpirad
- Milbemectina
- Olio minerale