

Cimici che danneggiano i frutti

Cimice asiatica

In occasione del nostro monitoraggio abbiamo rilevato la presenza della maggior parte di ninfe e adulti su altre piante ospiti (siepi o altri fruttiferi), con un aumento negli ultimi giorni.

Controllare e al bisogno intervenire

Consigliamo di effettuare attenti controlli per verificare la presenza di cimici e di punti di penetrazione sui frutti. I controlli dovrebbero essere eseguiti, preferibilmente, al mattino presto. Se si verifica la presenza degli insetti, consigliamo di intervenire.



Cimici autoctone

Soprattutto negli impianti in quota sono presenti, al momento, tutti gli stadi di sviluppo di diverse specie di cimici autoctone dannose per i frutti. Sarebbe importante continuare a controllare. Se viene rilevata la presenza, consigliamo di intervenire.

Scelta di prodotti

Per la scelta dei prodotti da impiegare rimandiamo alla circolare n° 23.

Patina bianca

Finora, nel corso dei nostri controlli abbiamo trovato solo singoli frutti colpiti da patina bianca.

Di regola, dapprima vengono colpiti i frutti situati nella parte inferiore della chioma. Un importante sintomo della patina bianca è il tipico odore di fungo che emanano i frutti colpiti.

Difesa

I trattamenti con **prodotti a base di captano e fosfonato di potassio** per la difesa dalla maculatura fuliginosa hanno, secondo le prove del Centro di Sperimentazione Laimburg, un effetto collaterale contro la patina bianca.