

## Trattamenti di chiusura sulle varietà autunnali

### Ticchiolatura

Su **tutte le varietà**, anche su quelle **resistenti alla ticchiolatura** il trattamento di chiusura dovrebbe essere effettuato tre settimane prima dell'inizio della raccolta con un prodotto contenente **captano**.

Per tutte le varietà che tollerano i prodotti rameici, sussiste – nei **frutteti colpiti dalla ticchiolatura** e in presenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli – la possibilità di utilizzare un prodotto a base **di rame**.

### Marciumi da conservazione

Sulle varietà **Kanzi, Fuji, Red Delicious e Pinova** si dovrebbe, dopo un trattamento di chiusura con un prodotto a base di captano, effettuare un ulteriore trattamento con **fludioxonil**:

Su **tutte le altre varietà** si dovrebbe pianificare un intervento con **fludioxonil** solo per le partite problematiche (es. impianti con scarsa carica produttiva).

### Evitare la deriva e i residui indesiderati

Quanto più si avvicina la data di inizio della raccolta, tanto più importante è evitare la deriva di fitosanitari sulle parcelle biologiche e sulle varietà con differente data di raccolta.

È importante fare attenzione ai seguenti punti:

- Distribuire fitosanitari solo in assenza di vento.
- Trattare miratamente, chiudere gli ugelli in sovrannumero e adeguare l'efficienza della ventola al volume fogliare delle piante.
- Trattare l'ultima fila solo in direzione del blocco varietale da trattare e/o del proprio appezzamento.
- Pulire accuratamente il serbatoio. Ciò è particolarmente importante se con lo stesso atomizzatore si distribuiscono prodotti su altre colture, il cui utilizzo non è autorizzato su melo.