

La difesa rodenticida in post-raccolta

È di regola nel tardo autunno che le popolazioni di roditori (topi campagnoli e arvicole) raggiungono la massima densità. I danni insorgono di conseguenza prevalentemente durante il riposo vegetativo e si rendono visibili in primavera. Durante i nostri controlli abbiamo potuto verificare che già ora l'attività dei roditori è elevata. In questi frutteti e in queste situazioni si dovrebbe intervenire immediatamente dopo la raccolta.

La difesa con esche pronte

In pieno campo è autorizzato l'impiego di sole due esche pronte (Ratron GL e Ratron GW) contenenti la sostanza attiva **fosfuro di zinco**.

form. comm.	s.a.	contenuto di s.a.	dose max./ha
Ratron GW	fosfuro di zinco	25 g/kg	2 kg
Ratron GL		8 g/kg	

Indicazioni generali

- Data la loro composizione, le esche pronte si addicono solo per la difesa dai topi campagnoli.
- Le esche pronte devono essere sistemate con una copertura (non lasciarle scoperte in campo!) per evitare che la selvaggina o gli animali domestici possano entrare in contatto con i prodotti.
- Per evitare ogni possibilità di contatto con la sostanza attiva è necessario indossare guanti di protezione, quando si sistemano le esche. Per la loro distribuzione consigliamo di utilizzare gli appositi utensili (Legefinte o Ratron® Appli-Gun).
- L'etichetta di queste esche prevede che quando vengono distribuite si esponga un cartello con la scritta "Attenzione derattizzazione in corso".



Ratron® Appli-Gun (sopra) e Legefinte (sotto)